



MANAGEMENT AF POLTE

DE VIGTIGSTE TJEKpunkTER:

- Mindst 11-12 mm rygspæktykkelse ved ankomst til løbestalden. Vi avler efter grise med stor og effektiv kødtilvækst. Poltene skal derfor fodres med en blanding, som er meget lav i protein (lysin) for at få den til at lægge mere fedt på kroppen inden løbning. Det bør ske fra ca. 60 kg.
- Hav fokus på de mindste og svageste polte.
- Inseminering i 2. eller 3. brunst.
- Løbning ved omkring 7,5 måned. Det betyder, at vi skal begynde at stimulere til poltens første pubertetsbrunst ved ca. 6,5 måneders alderen. Uge og dato registreres for at planlægge løbning.
- Flushing 5-12 dage op til forventet inseminering. Flushing (dvs. højere fodertildeling tæt på ædelyst) har til formål at øge fedningsgraden. Jo mere mager, jo flere dage med flushing. Desuden stimulerer det polten til bedre ægløsning.
- Brunstkontrol og stimulering med aktiv ornekontakt 2 gange daglig. Ornen skal i direkte kontakt med polten. Brug gerne forskellige orner for at give bedst mulig overraskelseseffekt.



Hold dig opdateret med den nyeste viden og vejledning om management af polte her:



danbred-manual.com/so-poltemanual/lobestald



svineproduktion.dk/Viden/I-stalden/Foder/Udfodring/Polte



danbred.com/da/tips-and-insights/danbreds-bedste-anbefalinger-til-fodring-af-polte