

Polte

Vejen til succes med polte ligger i at give dem opmærksomhed. Det gælder især i besætninger med hjemmeavl. Under opvæksten skal poltene fodres og passes som polte og ikke som slagtesvin. Dvs. de skal have god plads i stierne og fodres restriktivt med diegivningsblanding fra de er ca. 4 måneder gamle. Desuden er det vigtigt med menneskelig kontakt tidligt i opvæksten, så de er fortrolige og tillidsfulde inden brunstkontrollen starter.

Den bedste kuldstørrelse får man ved at løbe poltene ved en alder på ca. 8 måneder. Det svarer normalt til poltens 2. eller 3. brunst. Det er mest optimalt at ramme 2. brunst, dvs. at stimulering til 1. brunst bør udsættes til efter 6 måneders alderen. Det er derfor meget vigtigt at få registreret brunstdatoen på de unge polte, der ikke løbes.

Op til forventet løbning øges foderstyrken (flushing), hvilket vil sige fodring med 3,5-4 Fes pr. dag i minimum 5 dage før løbning. Flushing sikrer, at flest mulige æg løsnes.

Polte har en forholdsvis kort brunst, og de har ægløsning ca. 24 timer efter stående brunst er indtrådt. Derfor bør man kontrollere polte 2 gange dagligt for stående brunst over for en orne. Så snart polten viser stående brunst, løbes den, og igen efter 24 timer, hvis den stadig står.

Især polte kan have en "fold" over indgangen til børhalsen, der kan fange katetret, så det ikke kommer ind i børhalsen. Katetret sidder korrekt, hvis man kan mærke børenes tyngde ved at trække let tilbage i katetret.

Hos polte er det især vigtigt at være tålmodig og arbejde med brunstkontrollen efter et fastlagt mønster på hver enkelt polt. Det er polten, der bestemmer tempoet.



Poltene skal have direkte ornekontakt ved brunstkontrollen, enten hvor ornen er inde i stien ved poltene, eller ved trynekontakt på gangen foran poltene. Ornekontakten skal mindst være 20 minutter.



Hvis man bruger tre farver og skifter hver uge, er det let at overskue, hvornår poltene kommer i brunst.